

**RECONSTRUCTION DE PERTE DE SUBSTANCE
DE LA CAVITÉ BUCCALE
PAR UN LAMBEAU MUSCULO-CUTANÉ
DE PLATYSMA**

**LES DOCTEURS CAROLINE PIERREL,
MOUNSEF DELOUANE
ET PIETRO GAROFALO**

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE




PATIENT : FEMME DE 47 ANS

- + **TABAGISME 40 PA**
- + **ALCOOL QUOTIDIEN**
- + **T2 NO MO DU PLANCHER BUCCAL ANTÉRIEUR DROIT DÉPASSANT LA LIGNE MÉDIANE**
- + **DÉCISION RCP** EXÉRÈSE CHIRURGICALE AVEC ÉVIDEMENT GANGLIONNAIRE
BILATÉRAL DES ZONES I, II, III



DESSIN DE LA PALETTE CUTANÉE NÉCESSAIRE À RECOUVRIR LA PERTE DE SUBSTANCE,
SUR LE TRAJET DE L'INCISION DE PAUL-ANDRÉ




ARTÈRE FACIALE À PRÉSERVER

PALETTE CUTANÉE



TRAJET DU RAMEAU
MENTONNIER DU VII

INCISION DE PAUL ANDRÉ

INCISION ET DISSECTION MINUTIEUSE ENTRE LA PEAU ET LE PLATYSMA




DISSECTION SOUS LE PLATYSMA JUSQU'AU PÉDICULE FACIAL QUI EST PRÉSERVÉ, EN PRENANT SOIN
DE NE PAS LÉSER LA BRANCHE MARGINALE DU NERF FACIAL



**L'ÉVIDEMENT GANGLIONNAIRE DE LA ZONE IB
AINSI QUE L'EXÉRÈSE DE LA PIÈCE PERMETTENT DE PASSER
LE PÉDICULE DU LAMBEAU À TRAVERS LE PLANCHER BUCCAL**



FIXATION DU LAMBEAU PAR DES POINTS SÉPARÉS PROFONDS
ET SUPERFICIELS DE VICRYL 3/0



RÉSULTAT POST OPÉRATOIRE À J6



EXEMPLE DE RÉSULTAT À DISTANCE



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- ✦ RAMEAU MARGINAL DU NERF FACIAL CONTRE LE PLATYSMA LORS DE LA DISSECTION
- ✦ PRÉSERVER L'ARTÈRE FACIALE ET SA BRANCHE SOUS MENTALE AINSI QUE LA VEINE JUGULAIRE EXTERNE POUR UNE BONNE VASCULARISATION DU LAMBEAU
- ✦ ÊTRE VIGILENT ET PRENDRE SOIN DU LAMBEAU ET DE SON PÉDICULE LORS DES ÉVIDEMENTS GANGLIONNAIRES ET DE L'EXÉRÈSE DE LA PIÈCE
- ✦ ÉVITER TOUTE SOUFFRANCE DU PÉDICULE LORS DE LA MISE EN PLACE :
 - PAS DE TENSION
 - TUNNEL ASSEZ LARGE POUR TRAVERSER LE PLANCHER BUCCAL
- ✦ PEAU CERVICALE PLUS FRAGILE EN POST OPÉRATOIRE



AVANTAGES

- ✦ PRÉLÈVEMENT SIMPLE À CONDITION D'ÊTRE TRÈS MINUTIEUX
- ✦ SUR LE TRAJET DE L'INCISION CERVICALE ET DANS LA ZONE OPÉRATOIRE
- ✦ BONNE VASCULARISATION PAR RAPPORT À UN LAMBEAU LIBRE
- ✦ MOINS VOLUMINEUX DONC MEILLEURE PRÉSERVATION DE LA FONCTION (MOBILITÉ LINGUALE) QU'UN LAMBEAU DE GRAND PECTORAL
- ✦ POSSIBLE EN CAS DE PRÉSERVATION DES DENTS DE L'ARCADE MANDIBULAIRE (CONTRAIREMENT AU LAMBEAU DE FMM DONT LE PÉDICULE PASSE ENTRE LES ARCADES DENTAIRES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE.



ARTICLE INTÉRESSANT SUR LA TECHNIQUE CHIRURGICALE

✦ **ANNALES FRANÇAISES D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET DE PATHOLOGIE CERVICO-FACIALE**
VOL 118, N°2 - AVRIL 2001 PP.102-109

✦ **UTILISATION DU LAMBEAU MUSCULO-CUTANÉ DE PLATYSMA DU COU**
POUR LA RECONSTRUCTION DES PERTES DE SUBSTANCE APRÈS EXÉRÈSE CARCINOLOGIQUE
DES TUMEURS BUCCO-PHARYNGÉES

✦ **A PROPOS DE 70 CAS**

✦ **G. POISSONNET [1], O. DASSONVILLE [1], J. VALLICIONI [1], S. DEBRUYNE [1],**
.SANTINI [1], F. DEMARD [1][1] DÉPARTEMENTS DE CHIRURGIE ORL
ET CERVICO-FACIALE, CENTRE ANTOINE LACASSAGNE,
33 AVENUE DE VALOMBROSE, 06189 CEDEX 2 ET UNIVERSITÉ DE NICE,
SOPHIA ANTIPOLIS, NICE FRANCE.



DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO FORMATION

"TOUS LES SECRETS DE L'ENDODONTIE"

À TÉLÉCHARGER SUR WWW.BLEUBLANCDENT.FR

DANS L'ONGLET FORMATION EN LIGNE.

